



کد کنترل

822

F



822F



زمان پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۶۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	رابطه آب و خاک و گیاه	۲۰	۲۶	۴۵
۳	طرح آزمایش‌های کشاورزی	۲۰	۴۶	۶۵
۴	اکولوژی عمومی	۲۰	۶۶	۸۵
۵	حافظت خاک و آبخیزداری	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	ژئومورفولوژی	۲۰	۱۰۶	۱۲۵
۷	خاک‌شناسی مناطق خشک	۲۰	۱۲۶	۱۴۵
۸	حافظت آب و خاک	۲۰	۱۴۶	۱۶۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- Despite the fact that Gross Domestic Product (GDP) has increased substantially in the industrialized West, the levels of human contentment have remained -----.

1) apposite 2) interwoven 3) static 4) implicit
- 2- Immigration ----- from the Latin word migration and means the act of a foreigner entering a country in the aim of obtaining the right of permanent residence.

1) gathers 2) obtains 3) arises 4) derives
- 3- Not speaking the same language as your customers can lead to communication -----.

1) breakdown 2) brevity 3) gesture 4) imitation
- 4- The factory's workforce has ----- from over 4,000 to a few hundred.

1) withdrawn 2) dwindled 3) undercut 4) forecasted
- 5- The police came up empty-handed despite an ----- exploration of the suspect's home.

1) exhaustive 2) inescapable 3) ephemeral 4) inevitable
- 6- When the old man married a woman in her thirties, all everyone talked about was the ----- in the couple's ages.

1) diversity 2) disparity 3) longevity 4) extension
- 7- One local factory will ----- the town's job shortage by providing 250 more jobs.

1) overlook 2) adjust 3) displace 4) alleviate

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

One commentator argues that the success of private schools is not in their money, (8) ----- their organization. State schools fail their pupils because, under government control, they lack options. But if head teachers at state schools (9) ----- given the same freedom as those at private schools, namely (10) ----- poor teachers and pay more to good ones, parents would not need to send their children to private schools any more.

- | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-----------|------------|
| 8- | 1) that is | 2) it is in | 3) but in | 4) is |
| 9- | 1) had | 2) were | 3) to be | 4) be |
| 10- | 1) by sacking | 2) sacking | 3) sacked | 4) to sack |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The expansiveness of drylands around the world and the patch-mosaic nature of dryland vegetation can produce high heterogeneity in biogeochemical cycling across multiple spatial scales. As Earth's largest terrestrial biome, drylands are distributed across all continents and encompass enormous variability in soil-forming factors (i.e., parent material, topography, soil age, climate, and organisms), which drive fundamental differences in nutrient cycling dynamics from local to continental scales. The effects of dryland state factor variability are diverse, complex, and far-reaching. Although not comprehensive in scope and purpose, recent studies indicate that climate, local-scale topography, and parent material can interact to mediate soil respiration responses to rainfall pulses, and that seemingly subtle differences in soil texture may be a dominant driver of dryland nutrient availability. Patently, more research studies should be conducted in this regard in order to come to a convincing conclusion. Vegetation patchiness drives substantial differences in biogeochemical cycling at small spatial scales in drylands through a mixture of abiotic and biotic mechanisms. For instance, plants can drastically modify microclimate conditions beneath their canopies relative to adjacent intercanopy soils by physically blocking solar radiation and by altering moisture inputs and outputs through processes such as canopy interception and plant uptake. They also can create zones of nutrient enrichment and 'hotspots' of biogeochemical activity via litter inputs and root exudates as well as physically trapping litter transported across bare interspace soils. Soil nitrogen (N) concentrations can vary by two to three times between adjacent shrub and interspace soils. These N 'hotspots' found beneath shrub canopies can transfer N to the atmosphere at rates similar to those from fertilized agricultural fields, driven by anaerobic processes such as denitrification, which are otherwise considered rare across dry and aerobic dryland environments. In addition to high spatial heterogeneity, dryland biogeochemical cycling is sensitive to inter- and intra-annual fluctuations in temperature and precipitation. Variation in temperature and/or precipitation through time can result in pulse-dynamic biogeochemical cycling, generating complex temporal patterns in ecosystem processes, including primary production, trace gas emissions, and even plant community composition. Building our understanding of biogeochemical dynamics across space and through time in drylands will be crucial for improving our ability to forecast climate change effects on ecosystem structure and function.

- 11- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT -----.**
- 1) Variation in precipitation by no means result in generating complex temporal patterns.
 - 2) Vegetation patchiness drives variations in biogeochemical cycling at small spatial scales.
 - 3) The effects of dryland state factor variability are diverse, complex, and far-reaching.
 - 4) Soil nitrogen concentrations varies by two to three times between adjacent shrub and interspace soils.
- 12- What is the main purpose of this passage?**
- 1) To explain about the expansiveness of drylands around the world
 - 2) To explain about the patch-mosaic nature of dryland vegetation
 - 3) To explain about biogeochemical cycling and dynamics in drylands
 - 4) To explain about climate change impacts on ecosystem structure
- 13- What is the author's attitude towards the findings of the recent studies?**
- 1) Suspicion 2) Indifference 3) Admiration 4) Disregard
- 14- The word 'composition' in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.**
- 1) conservation 2) constitution 3) confiscation 4) continuation
- 15- The word 'they' in the passage (underlined) refers to -----.**
- 1) plants 2) soils 3) processes 4) conditions

PASSAGE 2:

Anticipating changes in resilience (or robustness) of natural systems is of paramount importance, given the increasing climate variability and anthropogenic disturbance. Various approaches have been developed for defining and measuring resilience, but particular attention has been given to measuring resilience in ecological systems that run a risk of abrupt and irreversible responses to external stress. Measuring changes in the spatial and temporal patterns of ecological dynamics has been qualified as an alternative approach for anticipating changes in their resilience and for detecting in time the probability of catastrophic shifts. In dryland ecosystems, changes in regular vegetation patterns, resulting from spatial self-organization, represent a consistent indicator for a catastrophic shift from a vegetated to a non-vegetated desertified state. Models describing vegetation dynamics accounting for different interactions between plants and water availability in drylands predict a robust sequential change from gapped to labyrinthine to spotted regular vegetation patterns along a spatial or temporal gradient of decreasing water availability (usually rainfall) before vegetation collapses to a desert state. These predictions have been matched with empirical observations in semi-arid regions where regular pattern formation appears to be ubiquitous. Increasing temporal variance and auto correlation of system state variable have been theoretically and empirically shown to be indirect measures of critical slowing down in systems approaching catastrophic shifts. The collection of long-term remotely-sensed data (e.g., satellite or aerial imaging data) have enabled the estimation of indicators of ecosystem resilience. Spatial indicators could be overlaid with such temporal indicators to test if predicted changes in spatial vegetation patterns are associated with critical slowing down in drylands under stress. If true, it will mean that spatial patterns would indicate slow ecosystem responsiveness due to critical slowing down. Thus, they aid in assessing changes in dryland resilience by using highly resolved remotely-sensed data, which is otherwise notoriously difficult to measure. Researchers have commenced to focus on these measurement difficulties.

16- What is the main purpose of this passage?

- 1) To explain about the utilization of long-term remotely-sensed data
- 2) To explain about the prediction of shifts in resilience of drylands
- 3) To explain about the resilience or robustness of natural systems
- 4) To explain about the variability in climate and anthropogenic disturbance

17- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT -----.

- 1) Models describing vegetation dynamics foresee change along a spatial or temporal gradient of increasing water availability before vegetation collapses.
- 2) Measuring changes in the spatial and temporal patterns of ecological dynamics has been qualified as an alternative approach for detecting the odds of catastrophic shifts.
- 3) Measuring changes in the spatial and temporal patterns of ecological dynamics has been qualified as an alternative approach for anticipating changes in their resilience.
- 4) Models describing vegetation dynamics foresee a robust sequential change from gapped to labyrinthine to spotted regular vegetation patterns.

18- The passage probably continues with a few sentences about -----.

- 1) temporal variance and auto correlation of system state variable
- 2) measurement difficulties for assessment of changes in dryland resilience
- 3) changes in vegetation patterns resulting from spatial self-organization
- 4) spatial or temporal gradient of decreasing water availability

19- The word ‘ubiquitous’ in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.

- 1) protectant 2) predominant 3) protuberant 4) pursuant

20- The word ‘they’ in the passage (underlined) refers to -----.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) spatial patterns | 2) predicted changes |
| 3) drylands under stress | 4) temporal indicators |

PASSAGE 3:

Intermittent rivers and ephemeral streams (IRES) are globally prevalent, especially in arid and semiarid regions often referred to as drylands. IRES within global drylands play critical roles: as sources of water supply, as habitats for plant and animal species, as hot spots for biogeochemical and contaminant reactions, and as corridors for the sediment transport, surface-groundwater exchanges, and stormwater effluent. Naturally, the streamflow presence in IRES occurs under high degrees of spatial and temporal variability. Under the combined effects of climate change and human activities, the spatial and temporal extents of IRES have been increasing in recent years, and the trend is expected to continue. Despite growing scientific evidence, policymakers did not recognize the importance of IRES in providing ecological and hydrological functions in landscapes. Yet, new policies have started to challenge environmental organizations to determine the jurisdictional status of these environmentally crucial agents. Current efforts often include the use of field inspections and citizen reports which have low sampling capacities and are difficult to scale up to large regions. A promising new technology is offered by small satellite remote sensing which has been used for surface water detection. For instance, Planet Labs uses a constellation of Cube Sats (i.e., a large fleet of small satellite units) to survey the entire Earth at a high spatial resolution and an unprecedented daily frequency since 2017. The resulting Planet Scope imagery have been used in a number

of scientific applications in the natural and built environments, for the detection of both permanent and ephemeral water bodies and their changes over time.

21- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT -----.

- 1) The streamflow presence in IRES occurs under high degrees of spatial and temporal variability.
- 2) Intermittent rivers and ephemeral streams are globally prevalent especially in drylands.
- 3) Under the mixed impacts of climate change and human activities, the spatial and temporal extents of IRES are increasing.
- 4) Current efforts include the use of citizen reports which have high sampling capacities and are easy to scale up to large regions.

22- What is the main purpose of this passage?

- 1) To explain about the vital role of IRES in arid and semiarid regions
- 2) To explain about a large fleet of small satellite units
- 3) To explain about small satellite remote sensing
- 4) To explain about permanent and ephemeral bodies of water

23- The word ‘these’ in the passage (underlined) refers to -----.

- 1) policies
- 2) organizations
- 3) policymakers
- 4) IRES

24- The word ‘inspection’ in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.

- 1) categorization
- 2) indignation
- 3) concentration
- 4) investigation

25- The word ‘ephemeral’ in the passage (underlined) is closest in meaning to -----.

- 1) constant
- 2) abiding
- 3) perpetual
- 4) transitory

رابطه آب و خاک و گیاه:

- ۲۶- کدامیک کسری آب برای گیاه است؟

(۱) اختلاف بین تبخیر و تعرق مینیمم با حقیقی

(۳) اختلاف بین تبخیر و تعرق گیاه مرجع با مینیمم

- ۲۷- در تعیین نیاز آبی گیاه کدامیک از موارد زیر روی ضریب گیاهی (KC) اثر می‌گذارد؟

(۱) ضریب انعکاس گیاهی

(۳) گسترش سیستم ریشه

- ۲۸- آب تشکیلی در گیاه به چه مفهومی است؟

(۱) آبی که گیاه در بافت و نسوج خود ذخیره می‌کند.

(۳) آبی است که گیاه تبخیر می‌کند.

- ۲۹- کدامیک معرف گیاهانی است که در عرصه‌های کوپری امکان رشد دارند؟

(۱) آگروفیت‌ها

(۲) زیروفیت‌ها

(۳) مزووفیت‌ها

- ۳۰- در چه طیف رطوبتی گیاه در شرایط مطلوب رشد بهتر می‌برد؟

(۱) رطوبت بین FC و PWP

(۲) رطوبت خاک بیشتر از نقطه FC

(۴) رطوبت خاک در نقطه Saturation

- ۳۱- برای اندازه‌گیری مکش رطوبت خاک در محدوده پایین از کدامیک استفاده می‌شود؟

(۱) نوترون‌متر

(۲) تانسیومتر

(۳) PF متر

(۴) لایسیمتر

-۳۲- در شرایط کمبود یا نبود آب در خاک چه اتفاقی می‌افتد؟

- (۱) دمای درون پوشش گیاهی بیشتر از دمای هوای اطراف می‌شود.
- (۲) دمای درون پوشش گیاهی کمتر از دمای هوای اطراف می‌شود.
- (۳) دمای درون پوشش گیاهی ابتدا زیاد و سپس کم می‌شود.
- (۴) دمای درون پوشش گیاهی ارتباطی به کمبود آب در خاک ندارد.

-۳۳- L.A.I (Leaf Area Index) معرف چه شاخصی از گیاه است؟

- (۱) تراکم پوشش گیاهی در واحد سطح
- (۲) انديس تحمل گیاهان نسبت به سرمای چایمان است.
- (۳) معیار تحمل گیاهان نسبت به کاهش تبخیر - تعرق است.
- (۴) طول دوره‌ای که در آن پیری زودرس در پوشش گیاهی اتفاق می‌افتد.

-۳۴- در مناطق خشک و نیمه‌خشک تولید شوری خاک در کدام سیستم آبیاری از همه کمتر است؟

- (۱) غلام گردشی
- (۲) قطراهای
- (۳) غرقابی
- (۴) نشتی

-۳۵- در رطوبت معادل نقطه نگهداری خاک، نیروی مکش کدام‌یک کمتر است؟

- (۱) شنی
- (۲) لومی
- (۳) سیلتی
- (۴) رسی

-۳۶- ماده خشک تولیدی به‌ازای هر واحد آب تعرق یافته توسط گیاه چه نامیده می‌شود؟

- (۱) کارایی مصرف کود در ظرفیت زراعی
- (۲) کارایی مصرف کود
- (۳) کارایی مصرف آب در رطوبت اشباع
- (۴) کارایی مصرف آب

-۳۷- آب آبی معرف چه خصیصه‌ای از آن است؟

- (۱) آبی است که فقط در صنایع و پالایشگاه‌ها قابل استفاده است.
- (۲) آب توسط مواد شیمیائی آبی شده و کاربردی ندارد.
- (۳) آب سالم و تمیز است و در همه محل‌های مصرف می‌تواند کاربرد داشته باشد.
- (۴) همان آب ژاول است که کاربرد آزمایشگاهی دارد.

-۳۸- جریان آب در خاک به چه عامل بستگی دارد؟

- (۱) ویسکوزیته
- (۲) الاستیسیته
- (۳) پرمعایلیته
- (۴) پلاستیسیته

-۳۹- کدام‌یک از عناصر زیر در شرایط آبشوئی خاک، کندتر از مابقی تخلیه می‌شود؟

- (۱) بر
- (۲) کلر
- (۳) سدیم
- (۴) نیتروژن

-۴۰- کدام گزینه، جهت تعیین نیاز آبی گیاه کاربرد دارد؟

- (۱) کونداكتی ویتی‌متر (Conductivitimeter)
- (۲) مانومتر (Manometer)
- (۳) تانسیومتر (Tensiometer)
- (۴) لیسیمتر (Lysimeter)

-۴۱- گیاهان مزوفیت در شرایط رطوبت معادل هیگروسکوپیسیته چه عکس‌العملی از خود نشان می‌دهند؟

- (۱) تغییر در رفتار مورفولوژیک می‌دهند.
- (۲) پژمرده می‌شوند.
- (۳) تغییر در رفتار فیزیولوژیک می‌دهند.
- (۴) اقدام به جذب آب از خاک می‌نمایند.

-۴۲- گستره نور مفید برای گیاهان شیرین، در چه طول موج نانومتری اتفاق می‌افتد؟

- (۱) ۴۰۰-۳۰۰
- (۲) ۷۰۰-۴۰۰
- (۳) ۲۰۰-۱۰۰
- (۴) ۳۰۰-۲۰۰

-۴۳- یکی از راههای اندازه‌گیری نفوذپذیری خاک کدام است؟

- (۱) نوترون‌متر
- (۲) گرانولومتر
- (۳) مانومتر
- (۴) بارومتر

- ۴۴- کدامیک از وسائل زیر جهت تعیین ضریب آبگذری خاک کاربرد دارد؟
 ۱) دابل رینگ ۲) PF متر ۳) تانسیومتر ۴) هیدرومتر
- ۴۵- گیاه در جهت مقابله با تنفس آبی به چه راهی متولسل می‌شود؟
 ۱) اقدام به توسعه پوشش گیاهی می‌کند.
 ۲) سعی به تحمل تنفس به طرق مختلف می‌کند.
 ۳) بلافاصله از بین می‌رود.
 ۴) اقدام به جذب مواد غذایی می‌کند.

طرح آزمایش‌های کشاورزی:

- ۴۶- موجود یا وسیله‌ای که مقایسه عوامل مورد مطالعه در یک طرح آزمایشی به کمک آن صورت می‌گیرد، کدام است؟
 ۱) تیمار ۲) ماده آزمایشی ۳) واحد آزمایشی ۴) کرت
- ۴۷- دلیل پخش تصادفی تیمارها در طرح‌های آزمایشی چیست؟
 ۱) همبستگی داده‌ها
 ۲) مستقل نمودن خطای آزمایشی
 ۳) ایجاد تنوع
 ۴) امکان برآورده اثرات متقابل
- ۴۸- اگر داده‌ها در یک آزمایش به صورتی باشد که واریانس‌ها متناسب با مربع میانگین تیمارها باشند، چه نوع تبدیلی مناسب است؟
 ۱) زاویه‌ای ۲) لگاریتمی ۳) جذری ۴) معکوس
- ۴۹- در صورتی که سودمندی نسبی طرح بلوک‌های کامل تصادفی نسبت به طرح کامل تصادفی ۱۲۰ به دست آمده باشد، کدام گزینه صحیح است؟
 ۱) در اثر بلوک‌بندی دقیق آزمایش افزایش کاهش یافته است.
 ۲) در اثر بلوک‌بندی دقیق آزمایش افزایش یافته است.
 ۳) بازده طرح کاملاً تصادفی بیشتر است.
 ۴) بلوک‌بندی تأثیری نداشته است.
- ۵۰- وقتی در آزمایشی دو منبع تغییر شناخته شده که با هم اثر متقابل ندارند، وجود داشته باشد، از چه طرح آزمایشی استفاده می‌شود؟
 ۱) طرح بلوک‌های کامل تصادفی
 ۲) طرح مربع لاتین
 ۳) آزمایش‌های فاکتوریل
- ۵۱- در یک طرح بلوک کامل تصادفی با هشت تیمار، حداقل چند مقایسه مستقل می‌توان انجام داد؟
 ۱) ۱ ۲) ۴ ۳) ۷ ۴) ۸
- ۵۲- در صورتی که در آزمایش به استفاده از کرت‌های بزرگ نیاز باشد، استفاده از چه طرحی مناسب است?
 ۱) آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ۲) بلوک‌های کامل تصادفی
 ۳) مربع لاتین
 ۴) کرت‌های خرد شده
- ۵۳- کدام گزینه در مورد طرح مربع لاتین نادرست است؟
 ۱) این طرح انعطاف‌پذیری زیادی دارد و در این طرح محدودیتی از نظر تعداد تیمارها وجود ندارد.
 ۲) طرح مربع لاتین توانایی اندازه‌گیری اثر محیط را در دو جهت مختلف دارد.
 ۳) کارایی و دقیق این طرح از طرح‌های کاملاً تصادفی و بلوک‌های کامل بیشتر است.
 ۴) کاربرد این طرح به ویژه هنگامی که یک آزمایش در چند محیط مختلف انجام می‌شود بیشتر از طرح بلوک‌های کامل است.

-۵۴- در یک طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار و ۳ تکرار، مجموع مشاهده‌های تیمار شاهد برابر ۳ و مجموع مشاهده‌های سایر تیمارها برابر ۶ است. مجموع مربعات مقایسه بین تیمار شاهد و سایر تیمارها کدام گزینه است؟

- | | |
|----------|---------|
| ۰/۱۳ (۲) | ۰/۱ (۱) |
| ۲/۷ (۴) | ۰/۹ (۳) |

-۵۵- در آزمایشی سه عامل A، B و C با ۳، ۳، ۲ سطح در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار بررسی شد. درجه آزادی خطای آزمایش کدام است؟

- | | |
|--------|--------|
| ۳۴ (۲) | ۳۲ (۱) |
| ۵۳ (۴) | ۳۶ (۳) |

-۵۶- در آزمایشی با ۶ تیمار و ۵ تکرار CV برابر با ۲۵ شده است، اگر مجموع کل مشاهده‌ها برابر با ۶۰۰ باشد، MS خطای آزمایش برابر با چند است؟

- | | |
|---------|--------|
| ۲۰ (۲) | ۵ (۱) |
| ۴۰۰ (۴) | ۲۵ (۳) |

-۵۷- در یک آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۶ تکرار اطلاعات ذیل به دست آمده است. مقدار میانگین مربعات خطای آزمایش (MSE) چقدر است؟

$$\sum (X_{3j} - \bar{X}_{30})^2 = 20$$

$$\sum (X_{1j} - \bar{X}_{10})^2 = 22$$

$$\sum (X_{2j} - \bar{X}_{20})^2 = 18$$

۲۰ (۲)	۳ (۱)
۶۰ (۴)	۲۴ (۳)

-۵۸- در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار، میانگین مربعات داخل تیمارها برابر ۲۰، ۲۵ و ۳۰ به دست آمده است. چنانچه میانگین‌های سطوح A برابر ۱۵ و ۲۵ باشد، دراین صورت مقدار F برای مقایسه سطوح عامل A کدام است؟

- | | |
|--------|--------|
| ۱۰ (۲) | ۸ (۱) |
| ۲۰ (۴) | ۱۶ (۳) |

-۵۹- جمع کل مشاهده‌های یک آزمایش فاکتوریل $3 \times 4 \times 5$ بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار برابر ۴۸۰۰ است. اگر ضریب تغییرات خطای آزمایش ۳۰ درصد باشد، مجموع مربعات خطای آزمایش کدام است؟

- | | |
|----------|----------|
| ۱۶۲۰ (۲) | ۱۵۹۳ (۱) |
| ۶۴۸۰ (۴) | ۶۳۷۲ (۳) |

-۶۰- با توجه به اطلاعات زیر که از یک طرح مربع لاتین به دست آمده است، میانگین مربعات مقایسه $A + B$ در برابر $C + D + E$ چقدر است؟

تیمار	A	B	C	D	E
جمع تیمار	۲	۴	۵	۴	۵

- | |
|----------|
| ۰/۶۷ (۱) |
| ۱ (۲) |
| ۱/۳۳ (۳) |
| ۲/۳۳ (۴) |

- ۶۱ در آزمایشی دو عامل A و B به ترتیب با ۴ و ۳ سطح در ۳ تکرار بر پایه طرح کاملاً تصادفی مطالعه شدند. اگر مجموع مربعات عامل‌های A و B به ترتیب برابر با $71/86$ و $13/72$ و مجموع مربعات تیمار برابر $88/97$ باشد، واریانس اثر متقابل دو عامل چقدر است؟

- (۱) ۰/۵۶۵
 (۲) ۴
 (۳) ۶/۸۲
 (۴) ۲۲/۹۵

- ۶۲ در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ بلوک مجموع مربعات خطای (SSE) برابر 54 به دست آمد. خطای معیار $S_{\bar{x}}$ برای مقایسه میانگین تیمارها چقدر است؟

- (۱) $\sqrt{3}$
 (۲) ۳
 (۳) $2\sqrt{3}$
 (۴) ۹

- ۶۳ در یک طرح مربع لاتین 3×3 با ۴ تکرار مربع، اگر مجموع مربعات خطای آزمایشی برابر $SSE = 84$ باشد، مقدار انحراف معیار تفاوت میانگین دو تیمار چقدر است؟

- (۱) ۱
 (۲) ۴
 (۳) ۶
 (۴) ۱۴

- ۶۴ مدل آماری زیر برای کدام طرح مناسب است؟

$$X_{ij(t)} = \mu + \delta_i + \delta_j + \delta_{(t)} + \varepsilon_{ij(t)}$$

(۱) مربع لاتین
 (۲) کاملاً تصادفی
 (۳) بلوک‌های کامل تصادفی
 (۴) فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی

- ۶۵ اگر عامل A در ۵ سطح در قالب طرح مربع لاتین در کرت‌های اصلی و عامل B با ۴ سطح در کرت‌های فرعی در یک طرح کرت‌های خرد شده مورد مطالعه باشند، درجه آزادی خطای اصلی و فرعی به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

- (۱) ۶۰ و ۲۰
 (۲) ۴۸ و ۲۰
 (۳) ۴۸ و ۱۲
 (۴) ۱۲ و ۶۰

اکولوژی عمومی:

- ۶۶ تنوع در مناطق اکوتون به چه صورت است؟

- (۱) کم است، ولی تعداد افراد هریک از گونه‌ها در داخل اکوتون بیشتر از تعداد افراد آنها در جامعه اصلی‌شان است.
 (۲) تنوع گیاهی بالا است، ولی تنوع جانوری پایین است.
 (۳) تنوع زیستی در اکوتون تفاوتی با تنوع در جوامع اصلی ندارد.

(۴) زیاد است، ولی تعداد افراد هریک از گونه‌ها در داخل اکوتون کمتر از تعداد افراد آنها در جامعه اصلی‌شان است.

- ۶۷ با استفاده از روش بطری‌های روشن و تاریک، کدام مورد اندازه‌گیری می‌شود؟

- (۱) تولید ثانویه در محیط‌های خشکی
 (۲) تولید اولیه در محیط‌های آبی
 (۳) تولید ثانویه
 (۴) تولید اولیه

- ۶۸ کدام موارد، گازهایی هستند، که اثر گلخانه‌ای به وجود می‌آورند؟

- (۱) هیدروژن - متان
 (۲) متان - نیتروژن
 (۳) دی‌اکسیدکربن - متان
 (۴) اکسیژن - دی‌اکسیدکربن

- ۶۹ در چرخه ازت طی کدام فرایند نیترات حاصله به ترکیبات گازی ازت، مانند N₂O و N₂ تبدیل می‌شود؟
- (۱) آمونیفیکاسیون (۲) دنیتریفیکاسیون (۳) نیتراتاسیون (۴) نیتراتاسیون
- ۷۰ کارایی اکولوژیکی در مراحل اولیه توالی و مراحل انتهایی به ترتیب از راست به چپ به چه نحوی تغییر می‌کند؟
- (۱) افزایش - کاهش (۲) کاهش - افزایش (۳) کاهش - کاهش (۴) افزایش - افزایش
- ۷۱ مصرف کنندگان بزرگ به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- (۱) گندخواران، علفخواران و گوشتخواران (۲) گیاهان سبز، پستانداران بزرگ و کوچک و حشرات (۳) زندهخواران و مردهخواران
- ۷۲ بیوم‌ها بیشتر تحت کنترل کدام عامل است؟
- (۱) ماکروکلیمای منطقه (۲) عرض جغرافیایی (۳) پوشش گیاهی غالب (۴) شرایط ادفایکی
- ۷۳ اگر خروجی یک سیستم و یا هر کدام از اجزاء سیستم دارای تأثیرگذاری باشند و منجر به تغییر حالت سیستم شوند، این چه حالتی از سیستم است؟
- (۱) پس خور (۲) انشعاب (۳) هوموستازی (۴) سینرژی
- ۷۴ در جمله «بررسی تأثیر کود شیمیایی بر وزن گونه‌های مرتتعی در مناطق کوهستانی شمال کشور» متغیر وابسته کدام است؟
- (۱) کود شیمیایی (۲) وزن گونه‌های مرتتعی (۳) مناطق کوهستانی شمال کشور (۴) گونه‌های مرتتعی
- ۷۵ تشییت و ترسیب کربن، جزو کدام دسته از روش‌های محیط‌زیست است؟
- (۱) اکولوژیکی (۲) زیباشناختی (۳) منفعت‌طلبانه (۴) اخلاقی
- ۷۶ انرژی که از هر سطح تغذیه‌ای می‌گذرد، با مقدار کل جذب در همان سطح چه رابطه‌ای دارد؟
- (۱) رابطه ندارد. (۲) رابطه منفی دارد. (۳) برابر است.
- ۷۷ تبدیل انرژی جذب شده به بافت‌های جدید در مصرف کنندگان را چه می‌گویند؟
- (۱) Assimilation (جذب) (۲) Secondary Production (تولید ثانویه) (۳) Ingestion (بلع) (۴) Primary Production (تولید اولیه)
- ۷۸ در حالتی که تولیدکنندگان اندازه بسیار کوچک و میزان رشد بسیار سریع داشته باشند، رأس کدام هرم یا هرم‌های اکولوژیک می‌تواند رو به پایین باشد؟
- (۱) بیوماس (۲) انرژی (۳) تعداد (۴) حجم
- ۷۹ رابطه بین جنگل یکدست و خالص سرو سیمین و محیط‌زیست آن از نوع کدام اکولوژی است؟
- (۱) فردی از منظر مکتب فرانسوی (۲) جمعی از منظر مکتب آمریکایی (۳) جمعی از منظر هر دو مکتب
- ۸۰ بالاترین لایه اتمسفر چه نامیده می‌شود؟
- (۱) مزوسفر (۲) اگزوسفر (۳) استراتوسفر (۴) ترموسفر

- ۸۱ در ارتباط با زمین، کدام مورد صحیح است؟
- (۱) از نظر انرژی و مواد بسته است.
 - (۲) از نظر انرژی و مواد سیستمی باز است.
 - (۳) از نظر انرژی سیستمی باز و از نظر مواد سیستمی بسته است.
 - (۴) از نظر انرژی سیستمی بسته و از نظر مواد سیستمی باز است.
- ۸۲ تعداد درصد افراد یک گونه، نسبت به کل افراد چه نامیده می‌شود؟
- | | | | |
|----------|-----------------|----------|------------|
| ۴) فرانس | ۳) ضریب پایداری | ۲) تراکم | ۱) فراوانی |
| E (۴) | D (۳) | C (۲) | B (۱) |
- ۸۳ بخش عمده سطح ایران دارای کدام نوع آب و هوا با تقسیم‌بندی کوپن است؟
- ۸۴ نسبت تولید ناخالص به بیوماس در اکوسیستم‌های جوان و بالغ مرتعی، به ترتیب چگونه است؟
- | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| ۴) زیاد - زیاد | ۳) کم - کم | ۲) کم - زیاد | ۱) کم - کم |
| ۴) بالفعل | ۳) پایه | ۲) بالقوه | ۱) خالی |
- ۸۵ آشیان اکولوژیکی که هنوز در اکوسیستم اشغال نشده، چه نامیده می‌شود؟

حفظه خاک و آبخیزداری:


- ۸۶ کدام مورد در حفاظت آب و خاک بخش‌های منابع طبیعی و کشاورزی مدنظر به ترتیب از راست به چپ قرار می‌گیرد؟
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ۲) آب‌شویی - آب‌شویی | ۱) تنفس برشی - آب‌شویی |
| ۴) آب‌شویی - آب‌شویی | ۳) تنفس برشی - تنفس برشی |
- ۸۷ کدام زون زمین‌شناسی در پروژه‌های حفاظت آب و خاک، بایستی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد؟
- | | | |
|-------------------|-------------|----------|
| ۱) زاگرس | ۲) جنوب شرق | ۳) البرز |
| ۴) سنندج - سیرجان | | |
- ۸۸ نقش اصلی در فرسایش آب ناشی از کدام نیرو است؟
- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| ۱) کوریولیس | ۲) هیدرولوژی | ۳) هیدرولیک |
| ۴) نقل | | |
- ۸۹ از نظر مالتوس صفت اجتناب‌ناپذیر حفاظت آب و خاک چیست؟
- | | |
|--|--------------|
| ۱) آب و خاک تحت فرسایش قرار نمی‌گیرند. | ۲) ناپایداری |
| ۳) پایداری ندارد. | |
- ۹۰ فرایند **Weathering** از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| Warming , Climate (۲) | Freezing , Melting (۱) |
| Lithosphere , Hydrosphere (۴) | Atmosphere , Air (۳) |
- ۹۱ واکنش‌های شیمیایی هیدرولیز و هیدراته‌شدن، چه فرایندی را ایجاد می‌نمایند؟
- | | |
|------------------|------------------|
| ۱) دگردیسی سنگ | ۲) فیزیکوشیمیایی |
| ۳) تخریب شیمیایی | ۴) تخریب فیزیکی |
- ۹۲ در نتیجه برخورد قطره باران با خاکدانه، کدام گزینه ابتدا واقع می‌شود؟
- | | |
|-----------------------------|------------|
| ۱) کوبیدگی و انتشار | ۲) پخشودگی |
| ۳) کوبیدگی، پخشودگی، انتشار | ۴) انتشار |

- ۹۳- نقش **stem flow** در حفاظت آب و خاک کدام است؟
- (۱) انتقال آرام جریان آب و خاک
 - (۲) فقط حفظ آب
 - (۳) فقط حفظ خاک
 - (۴) هیچ نقشی ندارد.
- ۹۴- جهت رفتارهای پیش‌نیاز آب در خاک کدام است؟
- (۱) Inrerception \leftarrow Stem flow
 - (۲) Infiltration \leftarrow Percolation
 - (۳) منبع اصلی تغذیه کننده چشمه، کدام جریان است؟
- Percolation \leftarrow Infiltration (۲)
Stem flow \leftarrow Inrerception (۴)
- ۹۵- Steam flow (۱)
Surface flow (۳)
- Inter flow (۲)
Stem flow (۴)
- ۹۶- طول عمر کدام روش حفاظت آب و خاک، بیشتر است؟
- (۱) سنگ‌چین ملات‌دار
 - (۲) بتنی
 - (۳) مهندسی
 - (۴) زیست مهندسی
- ۹۷- شبیه یکنواخت و عمق مناسب خاک، جزو خصوصیات کدام دامنه است؟
- (۱) نامنظم
 - (۲) آبراهه‌ای
 - (۳) منظم
 - (۴) بیرون‌زدگی سنگی
- ۹۸- اولین تحقیقات علمی در زمینه فرسایش خاک، توسط کدام دانشمند انجام شد؟
- (۱) شوم
 - (۲) چگودايف
 - (۳) نبت
 - (۴) ولنی
- ۹۹- فاز اول فرایند **Degradation**. کدام است؟
- (۱) Detachment
 - (۲) Aggregation
 - (۳) Transition
 - (۴) Attachment
- ۱۰۰- کدام روش می‌تواند به‌طور غیرمستقیم در کاهش فرسایش، نقش داشته باشد؟
- (۱) کاهش عمق معبر
 - (۲) افزایش ضریب زبری
 - (۳) کاهش ضریب زبری
 - (۴) عمیق کردن معبر
- ۱۰۱- در کدام سازند زمین‌شناسی، احتمال وقوع فرسایش هزاردره بیشتر است؟
- (۱) دزو
 - (۲) کرج
 - (۳) آسماری
 - (۴) میشان
- ۱۰۲- حالت خمیرایی، در کدام مورد بیشترین است؟
- (۱) رس و آهک
 - (۲) لای و رس
 - (۳) رس
 - (۴) لای
- ۱۰۳- مورد استفاده جام کاسگرانده کدام است؟
- (۱) تعیین حد روانی
 - (۲) ضریب زبری رس
 - (۳) ضریب زبری لای
 - (۴) تعیین درصد نفوذ
- ۱۰۴- درجه انحلال پذیری سنگ‌ها از بیشترین به کمترین کدام است؟
- (۱) گچ - ایندریت - آهک - نمک‌طعام - گچ - ایندریت - دولومیت
 - (۲) آهک - نمک‌طعام - گچ - ایندریت - ایندریت - نمک‌طعام
 - (۳) نمک‌طعام - آهک - دولومیت - ایندریت - گچ
- ۱۰۵- کدام جمله درست است؟
- (۱) سنگ‌های آذرین ۷۵٪ سطح زمین را تشکیل می‌دهند.
 - (۲) سنگ‌هایی رسوبی و رسوبات ۷۵٪ سطح زمین را تشکیل می‌دهند.
 - (۳) سنگ‌هایی دگرگونی ۷۵٪ سطح زمین را تشکیل می‌دهند.
 - (۴) سنگ‌های آذرین و دگرگونی ۷۵٪ سطح زمین را تشکیل می‌دهند.

ژئومورفولوژی:

- ۱۰۶- گلسنگ (Mudstone) متشکل از چه ذراتی می‌باشد؟
- (۱) ۵° درصد رس و ۵° درصد سیلت
 - (۲) رس زیاد و سیلت کم
 - (۳) مقادیر نسبتاً مساوی رس و سیلت
- ۱۰۷- انواع سیستم‌های فرسایشی و ایجاد ناهمواری در سطح زمین در اثر برهمنش کدام عوامل ایجاد می‌شوند؟
- (۱) لیتولوژی - تکتونیک
 - (۲) جنس سنگ - اقلیم
 - (۳) فیزیوگرافی - پوشش گیاهی
- ۱۰۸- لس‌های (Loesses) دوره کواترنری حاصل چه فرایندی بوده و در کدام زون زمین‌شناسی فراوان‌تر هستند؟
- (۱) (یخچالی - بادی) - کپه داغ
 - (۲) بادی - ایران مرکزی
 - (۳) ریزشی - کپه داغ
- ۱۰۹- طبق مورفولوژی رودخانه‌ها در کدام‌یک از بسترها مدت زمان بیشتری آب جریان دارد؟
- (۱) طغیانی
 - (۲) فرعی
 - (۳) اصلی
 - (۴) دوره‌ای
- ۱۱۰- در شرایط ایران پدیده هیدروفوسیستمی بیشتر در چه زمان‌هایی رخ می‌دهد؟
- (۱) پاییز و زمستان
 - (۲) تابستان و اوایل پاییز
 - (۳) اوخر زمستان و اوایل بهار
 - (۴) بهار و پاییز
- ۱۱۱- قدرت فرسایندگی باد تابعی از کدام مورد است؟
- (۱) توان دوم متوسط سرعت وزش باد بیشتر از سرعت آستانه
 - (۲) توان سوم متوسط سرعت وزش باد بیشتر از سرعت آستانه
 - (۳) توان دوم متوسط سرعت وزش باد بیشتر از سرعت آستانه و مدت وزش باد
 - (۴) توان سوم متوسط سرعت وزش باد بیشتر از سرعت آستانه و مدت وزش باد
- ۱۱۲- کدام مورد در خصوص ارتباط زمین‌شناسی و کیفیت آب درست است؟
- (۱) سنگ‌های گرانیتی کیفیت آب را کاهش می‌دهند.
 - (۲) منابع آب تحت تأثیر جنس زمین نیست.
 - (۳) عبور آب از مجاورت دیاپیرها به شدت باعث کاهش کیفیت آب می‌شود.
 - (۴) عبور آب از سنگ‌های آهکی و کارست‌ها به شدت کیفیت آب را کاهش می‌دهد.
- ۱۱۳- کدام رخداره ژئومورفولوژی می‌تواند در اثر عملکرد آب و باد در مواد مستحکم مناطق خشک ایجاد شود؟
- (۱) لکوت
 - (۲) کارن
 - (۳) برلن
 - (۴) تافونی
- ۱۱۴- براساس تعریف کانی کدام مورد نمی‌تواند کانی باشد؟
- (۱) دولومیت
 - (۲) کلسیت
 - (۳) آب
 - (۴) یخ
- ۱۱۵- چه رابطه‌ای بین ارتفاع از سطح زمین و سرعت باد در یک منطقه وجود دارد و با افزایش ارتفاع از سطح زمین سرعت باد چه تغییری می‌کند؟
- (۱) رابطه نمایی وجود دارد و با افزایش ارتفاع از سطح زمین سرعت باد افزایش می‌یابد.
 - (۲) رابطه نمایی وجود دارد و با افزایش ارتفاع از سطح زمین سرعت باد کاهش می‌یابد.
 - (۳) رابطه خطی وجود دارد و با افزایش ارتفاع از سطح زمین سرعت باد کاهش می‌یابد.
 - (۴) رابطه خطی وجود دارد و با افزایش ارتفاع از سطح زمین سرعت باد افزایش می‌یابد.

- ۱۱۶- کدام نوع از هوازدگی در باتولیت‌ها غالب است؟
 ۱) نمک شکافتگی ۲) اکسیداسیون
 ۳) انحلال ۴) پوست پیازی
- ۱۱۷- کدام نوع سنگ بار کف بیشتری نسبت به سایر گزینه‌های در مسیل‌های زون ایران مرکزی تولید می‌کند؟
 ۱) شیل ۲) سنگ آهک
 ۳) گرانیت ۴) مارن
- ۱۱۸- در کدام الگوی شبکه هیدروگرافی، همه آبراهه‌های فرعی با زاویه ۹۰ درجه به آبراهه اصلی متصل می‌شوند؟
 ۱) داربستی ۲) موازی
 ۳) حلقوی ۴) شعاعی
- ۱۱۹- در پلیمر تکتوسیلیکاته، هر سیلیسیم اکسیژن خود را با سیلیسیم‌های مجاور به اشتراک می‌گذارد.
 ۱) ۲ و ۳ ۲) ۳
 ۳) ۲ ۴) ۲
- ۱۲۰- پدیده سبزشده‌گی چاه نشانه کدام است؟
 ۱) فرسایش بادی ۲) فرسایش آبی
 ۳) تکتونیک ۴) نشست آبخانه
- ۱۲۱- تراکم جاده‌ها، اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی از ویژگی‌های کدام دشت سر است؟
 ۱) انتهایی ۲) اپانداز
 ۳) فرسایشی ۴) پوشیده
- ۱۲۲- کواستا دارای چه ویژگی‌هایی است؟
 ۱) گسل خوردگی و فرسایش در گدازه‌ها
 ۲) تکشیب در سنگ‌های رسوبی
 ۳) ناهمواری ساختمانی مرکب
- ۱۲۳- کدام مورد، نماینده توالی فراوان ترین عناصر پوسته زمین است؟
 ۱) نیتروژن - اکسیژن - سدیم - پتاسیم - گوگرد - آهن
 ۲) روی - آهن - منگنز - مس - گوگرد
 ۳) اکسیژن - سیلیسیم - آهن - آلومینیم - کلسیم - سدیم
 ۴) آهن - آلومینیم - سدیم - گوگرد - مس - اکسیژن
- ۱۲۴- شکل رو به رو، نشان‌دهنده کدام است؟
 ۱) ناودیس واژگون
 ۲) تاقدیس خوابیده
 ۳) تاقدیس متقارن
 ۴) ناودیس متقارن



آهک ژوراسیک



ماشه سنگ تریاس

- ۱۲۵- ترتیب سنگ‌ها از نظر افزایش حساسیت به فرسایش به کدام صورت است؟
 ۱) دولومیت - آهک - گنیس - کوارتزیت
 ۲) سنگ آهک - مرمر کلسیتی - سنگ دولومیت - کوارتزیت
 ۳) سنگ آهک - سنگ دولومیت - مرمر کلسیتی - مرمر دولومیتی
 ۴) مرمر کلسیتی - سنگ آهک - مرمر دولومیتی - سنگ دولومیت

خاک شناسی مناطق خشک:

۱۲۶- محدوده ارتفاعی خاک‌های سیروز姆، برونيزم و چرنوزم بر حسب متر چقدر است؟

$$(1) h > ۱۷۰۰ \text{ و } ۱۵۰۰ < h < ۲۳۰۰, ۱۵۰۰ < h < ۱۹۰۰$$

$$(2) h < ۱۵۰۰ \text{ و } ۱۵۰۰ < h < ۱۷۰۰, h > ۲۳۰۰$$

$$(3) ۱۹۰۰ < h < ۲۳۰۰ \text{ و } ۱۵۰۰ < h < ۱۷۰۰, h < ۱۵۰۰$$

$$(4) ۱۵۰۰ < h < ۱۷۰۰, ۱۹۰۰ < h < ۲۳۰۰ \text{ و } h < ۱۵۰۰$$

۱۲۷- در فرمول طبقه‌بندی اراضی بر مبنای خاک در عبارت $\frac{4\text{Hg}}{\text{Ba1-E0}} \text{II}_{\text{ST}}$ نفوذپذیری، بافت و شیب اصلی به ترتیب

از راست به چپ کدام موارد هستند؟

۴, a, B (۴)

a, H, ۴ (۳)

a, 4, H (۲)

B, H, ۴ (۱)

۱۲۸- لکه‌های رنگی (Mottling) خاص چه مناطقی است و دارای چه ویژگی هستند؟

(۱) مناطق مرطوب، نیمه‌مرطوب، خشک و نیمه‌خشک - بالا بودن سفره آبی

(۲) فقط خاص مناطق مرطوب - سطحی بودن سفره آب

(۳) خاص مناطق مرطوب - پایین بودن سفره آب

(۴) خاص مناطق کویری - بالا بودن سفره آبی

۱۲۹- کدام عنصر در ذخیره بهتر آب در خاک و جلوگیری از تراوش آن مؤثر است و عنصر مهم مؤثر در خلل و فرج مناسب خاک کدام موارد هستند؟

۱) کلسیم و منیزیم (۴)

۲) پتاسیم و کلسیم (۳)

۳) سدیم و کلسیم (۴)

۱۳۰- b, ca, es, en نشانگر چه ویژگی‌هایی از خاک هستند؟

(۱) تجمع سخت‌دانه‌های سرشار از سزکوئی اکسیدها، سولفات‌کلسیم، کربنات‌کلسیم و افق مدفون شده

(۲) تجمع سزکوئی اکسیدها، گچ، آهک و افق تکاملی

(۳) افق دارای گچ، آهک، نمک و افق ماده مادری

(۴) تجمع آهک، گچ، سزکوئی اکسیدها و افق دارای ماده آلی زیاد

۱۳۱- Solonetz, Arenosols, Leptosols به ترتیب به چه معنی است و در چه سیستمی طبقه‌بندی شده است؟

(۱) خاک شنی، خاک سطحی، خاک دارای نمک کم - سیستم FAO

(۲) خاک سطحی، خاک شنی، خاک دارای نمک کم - سیستم USDA

(۳) خاک سطحی، خاک شنی، خاک دارای نمک کم - سیستم FAO

(۴) خاک سطحی، خاک دارای ماده آلی فراوان و خاک سولونتر - سیستم USDA

۱۳۲- رس بیش از ۳۰٪، درصد اشباع بازی بیشتر از ۵۰٪، درصد اشباع بازی کمتر از ۳۰٪، هر کدام معرف چه رده‌ای از خاک‌ها است؟

۱) ورتی‌سول - مولی‌سول - اولتی‌سول (۲)

۲) مولی‌سول - ورتی‌سول - آلفی‌سول (۴)

۱) ورتی‌سول - مولی‌سول - اولتی‌سول (۳)

۲) آلفی‌سول - مولی‌سول - لستیدسول (۳)

۱۳۳- خاک‌هایی که $80 \text{ cm}^{\text{cm}}$ سطح آنها از مواد آلی است، معمولاً چه رده‌ای را تشکیل می‌دهند؟

۱) ورتی‌سول (۴)

۲) اولتی‌سول (۳)

۳) مولی‌سول (۴)

۴) هیستوسول (۱)

- ۱۳۴ - تفاوت سافت و ارنت در چه میزان سنگ و سنگریزه است و تفاوت آنتروپیک و مولیک در چه مقدار P_2O_5 است؟
- (۱) $25^{\circ} PPm - 25\% PPm$
 - (۲) $15^{\circ} PPm - 15\% PPm$
 - (۳) $15^{\circ} PPm - 15\% PPm$
- ۱۳۵ - هر کدام چه مفهومی دارند و سیستم نامگذاری آن کدام است؟ **RGe, Gld, Flm**
- (۱) مالی‌سول، راستیروسول، اوتروسول - سیستم FAO
 - (۲) مالی‌سول، گلی‌سول، رگوسول - سیستم FAO
 - (۳) مالیک‌فلوسول، راستیریک گلی‌سول، اوتریک رگوسول - سیستم USDA
 - (۴) مالیک‌فلوسول، راستیریک گلی‌سول، اوتریک رگوسول - سیستم FAO
- ۱۳۶ - افق‌های مالیک و آنتروپیک چه تفاوتی دارند؟
- (۱) در افق مالیک میزان P_2O_5 محلول در اسید سیتریک بیشتر از 100 پی پی ام است.
 - (۲) در افق مالیک میزان P_2O_5 محلول در اسید سیتریک کمتر از 100 پی پی ام است.
 - (۳) در افق مالیک میزان P_2O_5 محلول در اسید سیتریک کمتر از 15° پی پی ام است.
 - (۴) در افق مالیک میزان P_2O_5 محلول در اسید سیتریک بیشتر از 15° پی پی ام است.
- ۱۳۷ - حروف **m.k, z, y** که در کنار افق **B** نوشته می‌شوند به ترتیب از راست به چپ دلیل بر وجود کدام موارد هستند؟
- (۱) نمک محلول - آهک - جیپسم - سیمانی شدن
 - (۲) آهک - سیمانی شدن - نمک محلول - جیپسم
 - (۳) آهک - نمک محلول - سیمانی شدن - جیپسم
 - (۴) جیپسم - سیمانی شدن - نمک محلول - آهک
- ۱۳۸ - مهم‌ترین افق مشخصه سطحی در خاک‌های مناطق خشک کدام است؟
- (۱) کلسیک
 - (۲) مالیک
 - (۳) سالیک
 - (۴) اکریک
- ۱۳۹ - خاک‌های شور و قلیا در رده‌بندی قدیمی (۱۹۴۹) در کدام رده قرار می‌گیرند؟
- (۱) هالومورفیک
 - (۲) اینترazonال
 - (۳) زونال
 - (۴) آزونال
- ۱۴۰ - با افزایش بارندگی به ترتیب کدام خاک‌ها دیده می‌شوند؟
- (۱) چرنوزم - برونيزم - چست نات
 - (۲) چست نات - چرنوزم - برونيزم
 - (۳) چست نات - برونيزم - چرنوزم
 - (۴) چرنوزم - چست نات - برونيزم
- ۱۴۱ - گروه‌های بزرگ در خاک‌های آزونال شامل کدام خاک‌ها می‌شوند؟
- (۱) لیتوسول - لپتوسول - آرنوسول
 - (۲) لیتوسول - رگوسول - آلوویال‌سول
 - (۳) لیتوسول - رگوسول - آرنوسول
 - (۴) لپتوسول - رگوسول - لپتوسول
- ۱۴۲ - شرط ضخامت در وجود افق‌های پتروکلسیک و پتروجیپسیک چند سانتی‌متر است؟
- (۱) 10°
 - (۲) 20°
 - (۳) 30°
 - (۴) 40°
- ۱۴۳ - مهم‌ترین رده‌های خاک موجود در مناطق خشک کدام موارد هستند؟
- (۱) اریدی‌سولز و اینسپتی‌سولز
 - (۲) انتی‌سولز و اینسپتی‌سولز
 - (۳) اریدی‌سولز و ورتی‌سولز
 - (۴) انتی‌سولز و اریدی‌سولز
- ۱۴۴ - در افق سالیک حاصل ضرب ضخامت بر حسب سانتی‌متر در هدایت الکتریکی خاک بر حسب دسی زیمنس بر متر باید چقدر باشد؟
- (۱) مساوی یا بیشتر از 90° باشد.
 - (۲) مساوی یا بیشتر از 80° باشد.
 - (۳) مساوی یا بیشتر از 90° باشد.
- ۱۴۵ - کدام افق مشخصه در خاک‌های مناطق خشک یافت نمی‌شوند؟
- (۱) سالیک
 - (۲) اسپادیک
 - (۳) آرجیلیک
 - (۴) کمبیک

حفظ اب و خاک:

۱۴۶- ضخامت لایه‌ای از سطح زمین که سرعت باد در آن برابر صفر است، (Z_0) چقدر است؟

- | | |
|---|---|
| ۲) $\frac{1}{3^\circ}$ قطر ذرات در معرض باد | ۱) $\frac{1}{2^\circ}$ قطر ذرات در معرض باد |
| ۴) $\frac{1}{3^\circ}$ بزرگترین قطر ذرات موجود در خاک | ۳) $\frac{1}{3^\circ}$ بزرگترین قطر ذرات موجود در خاک |

۱۴۷- رابطه بین شدت بارش و انرژی، با کدام فرمول بیان می‌شود؟

$$E = \log_{10} I + E_{10} \quad (2) \qquad E = 0.873 \log_{10} I + 0.119 \quad (1)$$

$$E = \frac{m^n \cdot I}{\ln I} \quad (4) \qquad E = I - B \log_{10} I \quad (3)$$

۱۴۸- کدام رس‌ها، توان آماس‌پذیری پایینی دارند؟

- | | |
|--------|--------|
| ۲:۱) ۲ | ۱:۲) ۱ |
| ۱:۱) ۴ | ۲:۲) ۳ |

۱۴۹- توان آماس‌پذیری، کدام رس‌ها یکسان است؟

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ۲) مونتموریلونیت - اسمکتیت | ۱) اسمکتیت - کائولینیت |
| ۴) مونتموریلونیت - ورمی کولیت | ۳) ورمی کولیت - اسمکتیت |

۱۵۰- در فرایند فرسایش خندقی تقدم و تأخیر فرسایش‌ها به ترتیب کدام موارد هستند؟

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| Head Cut - Head Cut (۲) | Tunnel - piping (۱) |
| Piping - Head Cut (۴) | Piping - Tunnel (۳) |

۱۵۱- Pin چه کاربردی در فرسایش دارد؟

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ۱) همان فرسایش است. | ۲) در رسوب فقط کاربر دارد. |
|---------------------|----------------------------|

۳) برای اندازه‌گیری عمقی هدررفت خاک در فرسایش سطحی

۴) برای اندازه‌گیری ارتفاع جمع شدن خاک در فرسایش پاشماشی

۱۵۲- نقش Wash Load در تولید رسوب حوزه آبخیز، کدام است؟

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ۲) رسوبات دامنه‌ای و رودخانه‌ای | ۱) فرسایش کلی حوزه |
| ۴) رسوبات دامنه‌ای | ۳) رسوبات رودخانه‌ای |

۱۵۳- دقیق‌ترین روش تعیین میزان بار اتحالی، کدام است؟

- | | | | |
|----------|----------|-----------|--------|
| ۴) تبخیر | ۳) تخریب | ۲) EC متر | ۱) CEC |
|----------|----------|-----------|--------|

۱۵۴- حداقل عمق اندازه‌گیری رسوب با روش DOJ Method چقدر است؟

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ۲) $< 6^\circ$ متر | ۱) $> 6^\circ$ سانتی‌متر |
| ۴) $> 6^\circ$ متر | ۳) $< 6^\circ$ سانتی‌متر |

۱۵۵- رابطه Discharge و Charyage چیست؟

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|--|
| ۴) هیچ ارتباطی ندارند. | ۳) مستقیم | ۲) غیرمستقیم | ۱) به نسبت $\frac{C}{D} (\frac{1}{2})$ |
|------------------------|-----------|--------------|--|

- ۱۵۶ Trapping Cofficient در چه مرحله‌ای از فرایند رسوب انجام می‌شود؟
 ۱) تهنشینی
 ۲) برداشت
 ۳) انتقال
 ۴) انتقال و منشاء
- ۱۵۷ Echo-Sounder در چه روشی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 ۱) physical Model
 ۲) Mathematical Model
 ۳) Bathymetry
 ۴) Charyage
- ۱۵۸ معادله جهانی فرسایش خاک چه پارامتری را تعیین می‌نماید؟
 ۱) رسوب کل
 ۲) فرسایش و رسوب ویژه
 ۳) فرسایش و رسوب کل
 ۴) فرسایش و رسوب ویژه
- ۱۵۹ پوشش خاک (زنده و غیرزنده)، در کدام مدل برآورد فرسایش و رسوب مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 ۱) F.A.O
 ۲) Fournier
 ۳) StehliR
 ۴) F.A.O و Fournier
- ۱۶۰ چرا اندازه‌گیری فرسایش در مرحله برداشت، آسان‌تر است؟
 ۱) چون تغییرات سطح زمین قابل رویت هستند.
 ۲) چون میزان رسوبات کمتر است.
 ۳) در مرحله برداشت آسان‌تر نیست.
 ۴) اندازه‌گیری فرسایش در مرحله برداشت سریع‌تر است.
- ۱۶۱ شکل غالب پلات‌های فرسایش، کدام است؟
 ۱) مستطیل
 ۲) لوزی
 ۳) مربع
 ۴) بستگی به شرایط منطقه دارد.
- ۱۶۲ مراکز تولید داده‌ها، در آبخیزداری کشور، کدام است؟
 ۱) حوزه‌های آبخیز کوچک
 ۲) حوزه‌های آبخیز معرف
 ۳) حوزه‌های آبخیز بزرگ
- ۱۶۳ نسبت حجم مخزن به حجم آب ورودی سالیانه مخزن، در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 ۱) ضریب تلهاندازی رسوب
 ۲) جهت تعیین حداقل ارتفاع سد
 ۳) جهت تعیین حداکثر ارتفاع سد
- ۱۶۴ مورد استفاده معادله بیلان رسوب، کدام مورد است؟
 ۱) تعیین میزان مواد تهنشین‌شده در مخازن
 ۲) تعیین میزان مواد تهنشین‌شده در سدها
 ۳) تعیین میزان بار کف تهنشین‌شده در سدها
- ۱۶۵ کدام حالت در هوموس‌ها باعث حفظ خاک و آب می‌شود؟
 ۱) خاصیت کلوئیدی
 ۲) ریزدانه بودن
 ۳) انحلال
 ۴) خاصیت آبگذری

